

## **PROTOCOLES DE BLANCHISSAGE**

Les politiques et les procédures devraient viser la collecte, le transport, la manipulation, le lavage et le séchage du linge souillé, y compris à des fins de protection du personnel.

Le blanchissage du linge d'une clinique dentaire peut être effectué dans trois circonstances différentes :

### **1. SERVICES DE BLANCHISSAGE**

- Veuillez suivre les protocoles fournis par le service de blanchissage.

### **2. BLANCHISSAGE À LA CLINIQUE**

- **Buanderie**
  - La buanderie devrait être un emplacement dédié comprenant un emplacement spécifique et couvert pour l'entreposage du linge sale.
  - Le linge sale et le linge propre doivent être clairement séparés pendant l'ensemble du processus de blanchissage, y compris le transport et le rangement.
  - Le blanchissage devrait être effectué par une personne désignée et non entre chaque visite de patient par les membres du personnel clinique.
  - Le linge propre devrait être trié, emballé, transporté et rangé de manière à prévenir toute contamination accidentelle ou contamination par de la poussière ou des débris, ou tout contact avec du linge souillé ou un autre article sale.
  - Personnalisez/étiquetez toutes les tenues médicales et blouses de laboratoire.
- **Processus de blanchissage**
  - Les tenues médicales et les blouses de laboratoire devraient être lavées séparément des serviettes et des articles de nettoyage, comme les chiffons ou les têtes de balais à franges.
  - Manipulez le linge sale le moins possible et assurez-vous d'utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
  - Les contenants à linge doivent être imperméables, étanches, non poreux et en bon état; ils doivent en outre être décontaminés après leur utilisation.
  - Les sacs de linge doivent être bien attachés et ne pas contenir trop d'articles. Les sacs de linge réutilisables doivent être lavés avant d'être utilisés de nouveau; vous pouvez les laver avec le linge qui s'y trouvait.
  - La mention « linge sale » doit figurer sur les contenants ou les sacs de linge.
  - Avant de mettre les articles souillés dans la laveuse, veuillez enfiler l'EPI approprié.
  - Utilisez du javellisant au chlore sûr pour les couleurs ou un détergent antimicrobien.
  - Les tenues médicales et blouses de laboratoire devraient être nettoyées à la température maximale tolérée par le tissu pendant au moins 25 minutes.
  - Les articles lavés devraient être retirés de la laveuse dès que possible afin de réduire le risque de contaminer la laveuse et la formation d'un biofilm.
  - Transférez les articles dans la sècheuse.
  - Désinfectez la porte ou le couvercle de la laveuse avant d'en retirer le contenu. Cela permettra d'éviter la contamination du linge propre.
  - Avant de retirer des articles de la sècheuse et de les plier, veuillez enfiler l'EPI approprié.
  - N'utilisez **pas** le même EPI lorsque vous manipulez des articles souillés et des articles propres.

- **Protection des membres de votre équipe**
  - La buanderie devrait comprendre un lavabo réservé au lavage des mains ou du désinfectant pour les mains à base d'alcool.
  - Si de l'EPI réutilisable est porté, il doit être lavé au moins une fois par jour et être réservé à l'usage d'une seule personne.
  - Remplacez l'EPI dont l'intégrité a été compromise.
  - Effectuez l'hygiène des mains lorsque vous changez ou retirez vos gants.

### 3. BLANCHISSAGE À DOMICILE

- **Buanderie**
  - Le linge sale et le linge propre doivent être clairement séparés pendant l'ensemble du processus de blanchissage, y compris le transport et le rangement.
  - Le linge propre devrait être trié, emballé, transporté et rangé de manière à prévenir toute contamination accidentelle.
- **Processus de blanchissage**
  - Les tenues médicales et les blouses de laboratoire devraient être lavées séparément du linge de votre domicile.
  - Manipulez le linge souillé le moins possible afin d'éviter toute contamination.
  - Les contenants réservés au linge souillé doivent être imperméables, étanches, non poreux et en bon état; ils doivent en outre être décontaminés après leur utilisation.
  - Les sacs de linge doivent être bien attachés et ne pas contenir trop d'articles. Les sacs de linge réutilisables doivent être lavés avant d'être utilisés de nouveau; vous pouvez les laver avec le linge qui s'y trouvait.
  - La mention « linge sale » doit figurer sur les contenants ou les sacs de linge.
  - Avant de mettre les articles souillés dans la laveuse, veuillez enfiler l'EPI approprié.
  - Utilisez du javellisant au chlore sûr pour les couleurs ou un détergent antibactérien.
  - Les tenues médicales et blouses de laboratoire devraient être nettoyées à la température maximale tolérée par le tissu pendant au moins 25 minutes.
  - Les articles lavés devraient être retirés de la laveuse dès que possible afin de réduire le risque de contaminer la laveuse et la formation d'un biofilm.
  - Transférez les articles dans la sècheuse.
  - Désinfectez la porte ou le couvercle de la laveuse avant d'en retirer le contenu. Cela permettra d'éviter la contamination du linge propre.
  - Avant de retirer des articles de la sècheuse et de les plier, veuillez enfiler l'EPI approprié.
  - N'utilisez **pas** le même EPI lorsque vous manipulez des articles souillés et des articles propres.
- **Protection des membres de votre équipe**
  - La buanderie devrait comprendre un lavabo réservé au lavage des mains ou du désinfectant pour les mains à base d'alcool.
  - Si de l'EPI réutilisable est porté, il doit être lavé au moins une fois par jour.
  - Remplacez l'EPI dont l'intégrité a été compromise.
  - Effectuez l'hygiène des mains lorsque vous changez ou retirez vos gants.

**Remarque : Assurez-vous que les tenues de travail (y compris les chaussures) ne sont pas portées à l'extérieur de la clinique dentaire.**